

TP7 – Différences finies pour les problèmes elliptiques en dimension 1

Le problème

Considérons le problème : étant données deux fonctions c et f continues sur l'intervalle $[0, 1]$, trouver une fonction u deux fois continûment différentiable telle que

$$(P_1) \quad \begin{cases} -u''(x) + c(x)u(x) = f(x) & \text{si } 0 < x < 1, \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

But du travail

Mettre en place une méthode numérique pour résoudre le problème (P_1) , basée sur les différences finies. Faire une étude de convergence en fonction du pas de la discrétisation.

Mise en œuvre

- ◇ Écrire et programmer le schéma obtenu en prenant une différence centrée pour approcher la dérivée seconde, le tester sur un cas particulier.
- ◇ Faire une étude de convergence de la méthode pour un cas bien choisi.
- ◇ Reprendre le problème (P_1) en remplaçant la condition aux limites $u(1) = 0$ par $u'(1) = 0$ et faire une étude analogue.

Prolongements

Quelques pistes pour aller plus loin.

- ◇ Modifier l'équation différentielle dans (P_1) en prenant $-Au'' + Bu' = f(x)$, où A, B sont des nombres réels. Pour l'approximation prendre des différences centrées. Discuter de la stabilité du schéma en comparant le pas de discrétisation et le rapport A/B .
- ◇ Considérer le problème modèle

$$(P_2) \quad \begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) + c(x, y)u(x, y) = f(x, y) & \text{pour } (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1), \\ u(x, y) = 0 & \text{pour } (x, y) \text{ sur le bord du domaine.} \end{cases}$$

Écrire un schéma de discrétisation basé sur les différences centrées. Proposer une méthode de résolution du problème à partir de la méthode de Gauss-Seidel, en évitant de construire la matrice du système à résoudre.